

**Ergebnisse von operativen Eingriffen
an den Gallenwegen in den Jahren 1969
bis 1972 an der Chirurgischen Klinik
der Städtischen Krankenanstalten Fürth**

Vorgelegt

von

Rüdiger Stumpf

aus

aus Cham

Aus der Chirurgischen Klinik
der Städtischen Krankenanstalten Fürth/Bayern
Klinischer Direktor: Prof. Dr. F.Gall

Ergebnisse von operativen Eingriffen
an den Gallenwegen in den Jahren 1969
bis 1972 an der Chirurgischen Klinik
der Städtischen Krankenanstalten Fürth

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
dem
Fachbereich Medizin
der
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

vorgelegt
von
Rüdiger Stumpf
aus Cham

Gedruckt mit Erlaubnis des Fachbereichs Medizin
der Universität Erlangen-Nürnberg



Dekan: Prof. Dr. E. Rügheimer

Referent: Prof. Dr. F. Gall

Korreferent: Prof. Dr. G. Hegemann

Tag der mündlichen Prüfung: 17. November 1975

Gewidmet meiner Frau Ulrike

Inhaltsverzeichnis

I. Einführung und Problemstellung

II. Untersuchungsergebnisse

1. Zahl der Operationen
2. Altersverteilung
3. Geschlecht
4. Symptomatik
5. Steinnachweis und negatives Cholecystogramm
6. Begleiterkrankungen
7. Präoperative Diagnostik
8. Präoperative Komplikationen
9. Intraoperativer Befund
10. Schnittführung
11. Histologie
12. Postoperative Komplikationen
13. Das Postcholecystektomiesyndrom
14. Todesfälle
15. Nebenbefunde
16. Familienanamnese

III. Zusammenfassung

IV. Literaturverzeichnis

V. Lebenslauf

Ergebnisse von operativen Eingriffen an den Gallenwegen in den Jahren 1969 bis 1972 an der Chirurgischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Fürth.

I. Einführung und Problemstellung

Gallensteinleiden und Gallenblasenentzündungen mit ihren Komplikationen und Begleiterscheinungen sind sehr häufige Krankheitssymptome in der Medizin. Da bis heute kein sicher steinauflösendes Mittel entdeckt wurde, steht bei der Cholelithiasis die Cholecystektomie immer noch als Mittel der Wahl an erster Stelle der therapeutischen Maßnahmen.

Während nun beim Steinleiden, nach der röntgenologisch gesicherten Diagnose, der operative Eingriff in der Mehrzahl der Fälle obligatorisch ist, gibt es bei der chronischen, besonders aber bei der akuten Cholecystitis immer wieder Diskussionen über die Notwendigkeit einer chirurgischen Intervention. Bedenkt man, daß die chronische Cholecystitis eine Cholelithiasis begünstigt und umgekehrt beinahe jede Cholelithiasis eine chronische Cholecystitis hervorruft, sollte nach einer zweimal röntgenologisch negativen Galle der Entschluß zur Operation gefaßt werden. So fanden EDLUND und OLSSON bei einer chronischen Cholecystitis in 87% eine negative Galle im Röntgenbild.

Wir haben uns früher bei der akuten Erkrankung (W.SIEDE, ZUCKSCHWERT, DUPREZ) zunächst für die konservative Behandlung entschieden. Bei Verschlimmerung der Symptomatologie innerhalb der ersten 48 Stunden meinen wir aber, sei ein operatives Vorgehen gerechtfertigt. So ist denn KEHR's alte Forderung: "Die Operation sollte am Anfang des Gallensteinleidens stehen, nicht am Ende", aktueller denn je.

Die chronische Cholecystitis sollte schon wegen der engen Verbindung zum Steinleiden und zur Gallenwegsdyskinesie, sowie zur Pankreatitis (SHERLOCK) operativ angegangen werden. Hinzu kommen die allgemeinen Indikationen, wie steigendes Alter und Abkürzung des Krankenlagers.


Die vorliegende Arbeit untersucht die aufgetretenen prä- und postoperativen Komplikationen bei Cholelithiasis und nach Cholecystektomie der Jahre 1969 bis 1972 an der chirurgischen Klinik Fürth.

II. Untersuchungsergebnisse

1. Zahl der Operationen

Bei dem von uns statistisch erfaßten Krankengut handelt es sich um insgesamt 683 Cholecystektomien in den Jahren 1969 bis 1972.

Davon entfielen auf 1969:139, auf 1970:140, auf 1971:187 und auf 1972:217 Cholecystektomien. Eine stetige Zunahme der Operationen ist also klar erkennbar.



Man teilte dabei in komplizierte und unkomplizierte Fälle ein, wobei zunächst nur der Lokalbefund, das Alter und der Allgemeinzustand jedoch nicht beachtet wurden (Einteilung wie bei M. REIFFERSCHIED). Bei Tabelle 2 der komplizierten Cholecystitiden ist eine Häufung mehrerer Komplikationen beim einzelnen Patienten zu beobachten. Es zeigte sich ein prozentualer Anstieg in den einzelnen Jahrgängen, bezogen auf das Vergleichsjahr 1969.

Tabelle 2


Komplizierte Cholecystektomien

Jahr	1969		1970		1971		1972	
Gesamtzahl	139		140		187		217	
Anzahl/Prozent	A	%	A	%	A	%	A	%
Choledocholithiasis	18	13,0	35	24,8	38	20,1	46	21,2
Cholangitis, akute Entzündung	12	8,6	16	11,4	21	11,1	25	11,5
Papillenstenose	8	5,8	5	3,5	5	2,7	7	3,2
Perforation	5	3,6	9	6,4	9	4,8	16	7,4
Empyem	4	2,9	7	5,0	15	8,0	16	7,4
Abszess	2	1,4	3	2,1	4	2,1	10	4,6
Ileus	0	0	1	0,7	1	0,5	2	0,9
Ikterus	53	38,2	35	24,8	25	13,2	43	19,8
Pankreatitis	18	13,0	9	6,4	10	5,3	25	11,5
Nekrosen	2	1,4	4	2,8	6	3,2	10	4,6
Anzahl der komplizierten Cholecystektomien	132	87,9	124	87,9	134	71,0	200	92,1

Die prozentualen Unterschiede in den einzelnen Jahrgängen waren nur gering. Als häufigste Komplikationen sind der Ikterus (durchschnittlich 20,0%) und die Cholelithiasis (19,8%) zu werten, gefolgt von der Cholangitis (10,8%) sowie der Pankreatitis (9,0%). Der paralytische Begleit- bzw. der Gallensteinileus erreicht als seltenste Komplikation maximal 0,9%.

2. Altersverteilung

Aus Tabelle 3 wird die Altersverteilung des Krankengutes ersichtlich.



Es findet sich dabei die erwartete Häufung im Bereich des 40. bis 70. Lebensjahres, wobei in den letzten Jahren eine Zunahme der über 70jährigen erkennbar wird.

3. Geschlecht

Tabelle 4

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
männlich	33	25,7	50	35,5	50	26,5	56	25,8
weiblich	106	76,3	90	64,5	137	73,5	161	74,2
insgesamt	139	100	140	100	187	100	217	100

Hier zeigt sich die bekannte Mehrheit des weiblichen Geschlechts. Das Verhältnis männlich : weiblich beträgt etwa 1 : 3.

4. Symptomatik

Die Symptomatik der Gallensteinleiden ist sicher hinreichend bekannt. In Tabelle 5 sind die häufigsten Symptome aufgeführt, wobei aus der Tabelle nicht hervorgeht, daß bei ein und demselben Patienten mehrere Symptome gleichzeitig auftreten können.

Tabelle 5: Symptomatik

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
Koliken	70	50,4	83	58,9	110	58,3	128	58,9
Dauerschmerz in den Rücken ausstrahlend	13	9,4	17	12,0	48	25,4	47	21,6
Oberbauchschmerz	34	24,5	42	29,8	62	32,9	69	31,7
Urin dunkel	22	15,8	23	16,3	22	11,7	39	17,9
Stuhl hell	21	15,1	22	15,6	23	12,2	46	21,2
Juckreiz	3	2,2	6	4,3	1	0,5	4	1,8
Brechreiz, Übelkeit	16	11,5	5	3,5	20	10,6	26	11,9
Erbrechen	36	26,0	37	26,3	53	28,1	85	39,1
Aufstoßen	8	5,8	5	3,5	3	1,6	8	3,7
Blähungen	9	6,5	10	7,1	16	8,5	11	5,1
Völlegefühl	0	0	1	0,7	2	1,1	0	0
Obstipation	11	7,9	4	2,8	8	4,2	27	12,4
Appetitlosigkeit	6	4,3	8	5,7	12	6,4	11	5,1
Gewichtsabnahme	26	18,7	16	11,4	31	16,4	28	12,9
Fieber, Schüttelfrost	5	3,6	6	4,3	20	10,6	18	8,3
Diarrhoe	0	0	1	0,7	0	0	9	4,1

Das Leitsymptom bei der Cholelithiasis ist also eindeutig die Gallenkolik, gefolgt von Allgemeinsymptomen wie Erbrechen, sowie Oberbauchschmerzen zum Teil in den Rücken ausstrahlend. Erst an vierter Stelle folgen der typisch helle Stuhl und der dunkle Urin.

5. Steinnachweis und negatives Cholecystogramm

Entscheidend für eine operative Intervention ist zum Großteil der erste röntgenologische Steinnachweis bzw. das erste negative Cholecystogramm. Aus Tabelle 6 ist der zeitliche Abstand zwischen den obengenannten Röntgenbefunden und der Operation ersichtlich.

Tabelle 6

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
unter 1/2 Jahr	13 9,4	19 13,5	12 6,4	42 19,3
- 1 Jahr	5 3,6	8 5,7	15 8,0	8 3,7
- 2 Jahre	4 2,9	3 2,1	5 2,6	6 2,8
- 4 Jahre	2 1,4	6 4,3	0 0	5 2,3
- 8 Jahre	1 0,7	2 1,4	4 2,1	6 2,8
-12 Jahre	1 0,7	3 2,1	2 1,0	1 0,5
über 12 Jahre	1 0,7	0 0	2 1,0	2 0,9
röntgenologisch nicht erfaßt	112 80,6	99 70,6	157 78,9	147 67,6

In der Regel erfolgte also der röntgenologische Steinnachweis bereits 1/2 Jahr vor der Operation. Von chirurgischer Seite wird aber gefordert, daß der Röntgennachweis von Gallensteinen, die Beschwerden verursachen, bereits die Indikation zur Operation darstellt.

6. Begleiterkrankungen

Die Anamnesenzusammenstellung weist hierbei ein breites Spektrum auf, dessen einzelne Punkte aus Tabelle 7 ablesbar sind.

Tabelle 7

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
Herz-Kreislauf				
Herzinfarkt	3 2,2	11 7,8	2 1,1	2 0,9
Herzbeschwerden	5 3,6	1 0,7	20 10,6	19 13,3
Kreislaufkollaps	2 1,4	0 0	9 4,8	5 2,3
Zustand nach Apoplex	1 0,7	0 0	1 0,5	1 0,5

Fortsetzung Tabelle 7

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
Pulmonal				
Pneumonie	6 4,3	8 5,7	15 8,0	17 7,8
Lungenembolie	1 0,7	3 2,1	3 1,6	2 0,9
Asthma	1 0,7	0 0	0 0	0 0
Tbc	1 0,7	1 0,7	7 3,7	4 1,8
Magen-Darm-Kanal				
Ulcus ventriculi	2 1,4	4 2,8	6 3,2	12 5,5
Ulcus duodeni	1 0,7	1 0,7	2 1,0	3 1,4
Zustand nach BI	1 0,7	3 2,1	1 0,5	0 0
Zustand nach BII	5 3,6	0 0	4 2,1	7 3,2
Ileus	0 0	1 0,7	0 0	0 0
Darm-Op	2 1,4	1 0,7	1 0,5	1 0,5
Leber, Pankreas, Stoffwechsel				
Cholecystitis				
Cholangitis	2 1,4	3 2,1	4 2,1	0 0
Pankreatitis	0 0	2 1,4	2 1,0	1 0,5
Leberschaden	1 0,7	7 2,1	9 4,8	5 2,3
Gelbsucht	2 1,4	15 10,6	20 10,6	19 13,3
Diabetes	5 3,6	2 1,4	1 0,5	0 0
Hypercholesterinämie	0 0	0 0	1 0,5	0 0
Niere				
Nierenleiden	4 2,9	13 9,2	22 11,7	14 6,4

7. Präoperative Diagnostik

Eine der wichtigsten diagnostischen Maßnahmen zur Sicherung des Gallensteinleidens ist die röntgenologische Darstellung der

Gallenwege.

Tabelle 8 zeigt die röntgenologischen Befunde, die meist intraoperativ bestätigt wurden.

Tabelle 8

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
pos.Cholangio- und pos.Cholecystographie und Konkremente	9 6,5	16 11,7	3 1,6	0 0,0
pos.Cholangio- und neg.Cholecystographie	23 16,6	29 20,6	34 18,0	57 26,6
mehrere Konkremente	4 2,9	3 2,1	21 11,1	24 11,0
Solitärstein	11 7,9	5 3,5	15 7,9	15 6,9
unbestimmte Cholelithiasis *	40 28,8	37 26,3	57 30,2	59 27,1
Porzellangallenblase	3 2,2	0 0	1 0,5	0 0
neg.Cholangio- und neg.Cholecystographie	1 0,7	19 13,5	7 3,7	18 8,3
Schrumpfgallenblase	0 0	1 0,7	1 0,5	0 0
gestauter Choledochus	3 2,2	8 5,7	3 1,6	0 0
flaues Cholangiogramm	6 4,3	15 10,6	3 1,6	8 3,7
Choledocholithiasis	2 1,4	0 0	1 0,5	2 0,9
o.B.	1 0,7	1 0,7	2 1,0	3 1,4
Magenprozess	1 0,7	0 0	1 0,5	1 0,5
entzündete Affektionen im Pankreasbereich	0 0	1 0,7	0 0	0 0
nicht röntgenologisch erfaßt	35 25,1	5 4,2	38 19,2	30 13,9

* röntgenologisch keine genaue Differenzierung

Am häufigsten wurde also eine Cholelithiasis beschrieben, während die negative Cholecystographie an zweiter Stelle rangiert.

Im Gegensatz zum röntgenologischen Nachweis ist die Laboratoriumsdiagnostik relativ unspezifisch. Wie aus Tabelle 9 ersichtlich, finden sich meist die allgemein typischen Zeichen einer akuten bzw. chronischen Entzündung im Bereich von Leber und Galle sowie deren Nachbarorganen, wie Bilirubin-, Diastaseerhöhung und erhöhte BKS. Die Erhöhung der alkalischen Phosphatase kam über 6,4% 1971 nicht hinaus.

Tabelle 9

		1969		1970		1971		1972	
		A %		A %		A %		A %	
Bilirubin									
	1 - 4	18	13,0	19	13,5	23	12,2	28	12,9
	5 - 10	5	3,6	4	2,8	9	4,8	13	6,0
über	10	7	5,0	5	3,5	2	1,1	8	3,7
Leukozyten									
	- 10000	2	1,4	1	0,7	2	1,1	2	1,0
	- 15000	7	5,0	6	4,3	15	8,0	23	10,6
	- 30000	3	2,2	9	6,4	11	5,8	14	6,4
Diastase									
	- 100	12	8,6	9	6,4	42	22,3	40	18,4
	- 200	2	1,4	3	2,1	3	1,6	12	5,5
	- 500	2	1,4	2	1,4	1	0,5	0	0
	- 1000	3	2,2	5	3,6	0	0	7	3,2
über	1000	3	2,2	2	1,4	0	0	0	0
GPT									
	- 50	1	0,7	4	2,8	4	2,1	6	2,8
	- 100	4	2,9	5	3,6	5	2,6	10	4,6
über	100	1	0,7	4	2,8	6	3,2	10	4,6
GOT									
	- 50	4	2,9	4	2,8	8	4,2	9	4,1
	- 100	1	0,7	4	2,8	4	2,1	10	4,6
über	100	1	0,7	2	1,4	5	2,6	9	4,1

Fortsetzung Tabelle 9

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
BKS				
- 20	2 1,4	0 0	8 4,2	8 3,7
- 50	24 17,3	15 10,6	43 22,8	53 24,4
- 100	23 16,6	16 11,4	12 6,4	35 16,1
über 100	1 0,7	4 2,8	6 3,2	9 4,1
LDH				
- 250	2 1,4	2 1,4	0 0	0 0
- 300	1 0,7	2 1,4	3 1,6	1 0,5
- 400	2 1,4	1 0,7	2 1,1	8 3,7
über 400	0 0	1 0,7	5 2,6	3 1,4
alkalische Phosphatase	3 2,2	5 3,6	12 6,4	10 4,6
Laborwerte unauffällig	5 3,7	6 5,1	0 0	0 0

8. Präoperative Komplikationen

Wie aus der Literatur bekannt, sind beim Gallensteinleiden präoperative Komplikationen sehr häufig; Tabelle 10 gibt die Frequenz in unserem Krankengut wieder.

Tabelle 10

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
Pankreatitis	18 13,0	9 6,4	9 4,8	17 7,8
Ikterus	53 38,2	35 24,9	25 13,3	43 19,8
Gallensteinileus	0 0	1 0,7	0 0	2 1,0
paralytischer Begleitileus	0 0	0 0	1 0,5	0 0
Cholecystitis,Cholangitis	7 5,1	22 15,6	29 15,4	27 12,4
Hepatitis	3 2,2	1 0,7	0 0	1 0,5
Perforationsperitonitis	5 3,6	7 5,0	6 3,2	9 4,1
ohne Komplikationen	53 37,9	65 46,7	117 62,8	118 54,4

Ikterus, Cholecystitis bzw. Cholangitis und auch Pankreatitis sind also die häufigsten präoperativen Komplikationen. Ein paralytischer Begleitileus trat nur einmal, der Gallensteinileus jedoch dreimal auf. Während eine Hepatitis bei insgesamt 5 Patienten (0,5% - 2,2%) gefunden wurde, lag die Perforationsperitonitis zwischen 3,2% und 5,0%.

9. Intraoperativer Befund

Bei den durchgeführten Gallenoperationen wurden folgende intraoperativen Befunde erhoben.

Tabelle 11

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
solitäre Steine in der Gallenblase	29	20,9	19	13,5	29	15,4	38	17,5
multiple Steine in der Gallenblase	93	67,0	95	67,5	128	67,8	151	69,5
keine Steine	7	4,9	17	12,0	7	3,5	7	3,5
intraoperatives Cholangiogramm o.B.	18	13,0	65	46,1	118	62,5	141	64,9
intraoperatives Cholangiogramm verdächtig	7	4,9	21	15,0	19	9,5	25	12,5
Gallenblasenperforation	5	3,5	9	6,3	9	4,5	16	8,5
Gallenblasenempyem	4	2,8	7	4,9	15	7,5	16	8,5
Gallenblasenhydrops	5	3,5	3	2,1	12	6,0	36	18,0
Schrumpfgallenblase	8	5,6	15	10,5	22	11,0	17	8,5
Gallenblasencarcinom	3	2,1	0	0	1	0,5	2	1,0
nekrotische Gallenblase	2	1,4	4	2,8	6	3,5	10	5,0
Porzellangallenblase	0	0	0	0	1	0,5	0	0
akute Cholecystitis	12	8,6	16	11,2	21	10,5	25	12,5

Fortsetzung Tabelle 11

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
Cysticusstein	3 2,1	4 2,8	8 4,0	15 7,5
entzündlicher Cysticusverschluß	2 1,4	0 0	1 0,5	6 3,0
Papillenstein	2 1,4	5 3,5	7 3,5	9 4,5
Papillensklerose Papillenstenose	1 0,7	4 2,8	2 1,0	6 3,0
Steine im Ductus hepaticus	0 0	1 0,7	2 1,0	1 0,5
Pankreasbeteiligung	10 7,2	9 6,3	10 5,0	25 12,5
Anomalie der Gallenwege	3 2,1	0 0	3 1,5	6 3,0
Leberbeteiligung	3 2,1	5 3,5	8 4,0	6 3,0
Lebercarcinom	0 0	1 0,7	0 0	2 1,0
Lebercysten	0 0	1 0,7	0 0	1 0,5
Pericholerischer Abszess	2 1,4	3 2,1	4 2,0	10 5,0
Ascites	2 1,4	1 0,7	1 0,5	0 0
penetrierendes Ulcus ventriculi et duodeni	1 0,7	1 0,7	0 0	1 0,5

Der intraoperative Befund zeigte bei 67,0% - 69,5% der operierten Patienten multiple Gallenblasensteine, bei 13,5% - 20,9% fanden sich dagegen Solitärsteine. Die "steinlosen Gallen" sanken von 12,0% (1970) auf 3,5% (1972).

Perforation, Empyem, Hydrops stiegen in den letzten Jahren deutlich an. Das Gallenblasencarcinom erreichte 1969 2,1%, 1972 nur noch 1,0%. Im gesamten Patientengut trat erstaunlicherweise eine einzige Porzellangallenblase auf. Die totale Gallenblasennekrose dagegen stieg von 1,4% auf 5,0% im Jahr 1972. Die akute Cholecystitis lag zwischen 8,6% und 12,5%, der entzündliche Cysticusverschluß zwischen 0,5% und 3,0%. Der Papillenstein bewegte sich zwischen 1,4% und 4,5%, die Papillensklerose bzw. -stenose zwischen 0,7% und 3,0%, die Steine in den Ductus hepatici zwischen 0,5% und 1,0%. Die Pankreasbeteiligung hingegen liegt mit 12,5% 1972 um fast über die Hälfte höher als mit 5,0% 1971. Anomalien überschritten

nie die 3,0%-Grenze. Das Lebercarcinom fand sich in nur drei Fällen des gesamten Krankengutes.

In Tabelle 12 sind nur die neben der normalen Cholecystektomie zusätzlich vorgekommenen intraoperativen Maßnahmen aufgeführt.

Tabelle 12

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
Choledochusrevision mit Steinen	14	9,8	20	14,0	25	12,5	30	15,0
Choledochusrevision ohne Steine	4	2,8	15	10,5	13	6,5	16	8,0
Choledochotomie	12	8,4	20	14,0	26	13,0	42	21,0
T-Drain	10	7,0	12	8,4	19	9,5	48	24,0
Papillotomie	8	5,6	5	3,5	3	1,5	7	3,5
Duodenotomie	1	0,7	3	2,1	3	1,5	7	3,5
Cholecystojejunostomie	0	0	0	0	3	1,5	0	0
Choledochoduodenostomie	3	2,1	4	2,8	0	0	1	0,5
Papille aufbougiert	0	0	0	0	0	0	25	12,0
mit Magenoperation	5	3,5	1	0,7	2	1,0	8	4,0
mit anderen Operationen	2	1,4	1	0,7	3	1,5	8	4,0

Auffallend dabei ist das starke Ansteigen des Einlegens eines T-Drains von 7,0% auf 24,0% im Jahre 1972.

Die normale Choledochusrevision stieg von 12,6% 1969 über 24,5% 1970 auf 23,0% 1972. Die Papillotomien erreichten mit 5,6% 1969 gegenüber nur 1,5% 1971 ihre Spitze. 1972 wurden bei 12,0% die Papillen aufbougiert, während das 1969 bei keinem Patienten der Fall war.

Die übrigen Eingriffe wie Duodenotomie, Cholecystojejunostomie und Choledochoduodenostomie differierten in den ausgewerteten vier Jahren nur wenig. Ebenso war es bei den zusätzlichen Magenoperationen, wie auch bei Begleitoperationen (z.B. Appendektomien).

10. Schnittführung

Bei den durchgeführten Operationen wurden folgende Schnittführungen angewandt:

Tabelle 13

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
Rippenbogenrandschnitt	0 0	39 27,7	46 24,4	87 40,0
Transrektalschnitt	1 0,7	33 23,4	115 61,0	95 43,7
Paramedianschnitt	1 0,7	1 0,7	8 4,2	10 4,6
Pararektalschnitt	1 0,7	2 1,4	5 2,7	5 2,3
Oberbauchmedianschnitt	136 97,9	65 53,2	13 7,7	20 9,4

Dabei zeigte sich, daß im Jahr 1972 der Rippenbogenrandschnitt gegenüber dem Transrektalschnitt stark aufgeholt hat, während der Oberbauchmedianschnitt - 1969 noch führend - 1972 nur noch bei 9,4% der Fälle angewandt wurde.

11. Histologie

Die histologischen Befunde der untersuchten Präparate sind in Tabelle 14 aufgeführt; auch hier sind Überlagerungen der Befunde zu beachten.

Tabelle 14

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
Kein wesentlich krankhafter Befund	38 27,5	42 29,9	59 31,3	56 25,8
Chronische Cholecystitis	84 60,6	84 59,6	110 58,3	147 67,6
Ulceröse, nekrotische Cholecystitis	2 1,4	12 8,5	10 5,3	12 5,5

Fortsetzung Tabelle 14

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
a) akute entzündliche Veränderungen	2	1,4	1	0,7	7	3,7	11	5,1
b) mit Pericholecystitis	1	0,7	0	0	1	0,5	5	2,3
katarrhalische Entzündung der Gallenblasenschleimhaut	1	0,7	0	0	0	0	0	0
Schleimhautatrophie der Gallenblase	1	0,7	3	2,1	1	0,5	0	0
Gallenblasenempyem	1	0,7	0	0	2	1,0	0	0
Gallenblasencarcinom	1	0,7	1	0,7	1	0,5	1	0,5
Porzellangallenblase	0	0	1	0,7	0	0	1	0,5
totale Nekrose der Gallenblase	0	0	2	1,4	1	0,5	0	0
Papillom der Gallenblase	0	0	0	0	1	0,5	0	0
Choledochuscarcinom	1	0,7	0	0	0	0	2	1,0
Pankreatitis	0	0	1	0,7	1	0,5	0	0
Pankreascarcinom	0	0	0	0	1	0,5	2	1,0
Leberbeteiligung								
a) Leberverfettung	3	2,1	0	0	3	1,6	3	1,4
b) Zirrhose	1	0,7	0	0	0	0	0	0
c) Hepatitis	0	0	2	1,4	1	0,5	1	0,5
d) Ikterus	0	0	2	1,4	2	1,0	0	0
e) Abszess	2	1,4	0	0	0	0	1	0,5
f) Hamartom der Leber	0	0	0	0	0	0	2	1,0
Lymphdrüsen-Tbc	0	0	0	0	1	0,5	0	0
nicht histologisch gesichert	1	0,7	0	0	0	0	0	0

Erwartungsgemäß ist die chronische Cholecystitis der häufigste histologische Befund; sie stieg von 60,6% 1969 auf 67,6% 1972. Keine wesentlich krankhaften Veränderungen an der Gallenblase wurden während der Jahre 1969 bis 1972 beinahe gleichbleibend zwischen 27,5% und

31,3% gefunden. Die akuten entzündlichen Veränderungen stiegen dagegen bis 5,1% (mit Pericholecystitis 7,4%) im Jahre 1972 an. Die ulcerös-nekrotisierende Cholecystitis schwankte zwischen 1,4% 1969 und 8,5% 1970. Alle übrigen histologischen Befunde bewegten sich unter 2,0%.

12. Postoperative Komplikationen

Wie aus Tabelle 15 hervorgeht, werden die postoperativen Komplikationen in lokale und allgemeine unterteilt.

Tabelle 15

<u>I. Lokal</u>	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
Wundheilungsstörungen	7 5,0	5 3,6	9 4,8	5 2,3
Platzbauch	0 0	1 0,7	1 0,5	0 0
Bauchdeckenabszess	1 0,7	0 0	2 1,0	1 0,5
Choledocholithiasis				
a) mit Nachoperation	1 0,7	0 0	2 1,0	0 0
b) ohne Nachoperation	1 0,7	0 0	1 0,5	2 1,0
Cholangitis	2 1,4	0 0	1 0,5	3 1,5
Ikterus	3 2,1	1 0,7	1 0,5	1 0,5
Narbenhernie	2 1,4	0 0	1 0,5	1 0,5
Peritonitis	0 0	0 0	1 0,5	0 0
Pankreatitis	0 0	1 0,7	4 2,1	0 0
subphrenischer Abszess	0 0	1 0,7	0 0	0 0
<u>II. Allgemein</u>				
Pneumonie	2 1,4	3 2,1	0 0	1 0,5
Lungenembolie	1 0,7	1 0,7	3 1,6	3 1,5
Lungenatelektase	0 0	0 0	2 1,0	0 0
Lungenödem	1 0,7	0 0	1 0,5	1 0,5
Herzinfarkt	1 0,7	0 0	0 0	1 0,5

Fortsetzung Tabelle 15

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
Venenthrombose	1 0,5	0 0	0 0	1 0,5
Harnwegsinfekt	6 4,3	3 2,1	2 1,0	0 0
Ileus	0 0	0 0	0 0	1 0,5
Magenausgangsstenose	0 0	0 0	0 0	1 0,5
Exitus	4 2,8	12 8,5	4 2,1	7 3,2
ohne Komplikationen	106 76,9	112 80,2	152 81,9	188 85,5

Zu I. Lokal

Bei den lokalen Komplikationen gingen die Wundheilungsstörungen deutlich von 5,0% auf 2,3% zurück. Ein Platzbauch trat nur bei zwei, ein Bauchdeckenabszess nur bei vier Patienten auf. Ebenfalls erstaunlich niedrig liegt die Zahl der primär im Choledochus belassenen Steine (Residualstein); 1969 bei 1,4% und 1972 bei insgesamt 1,5%, während 1970 kein einziger Gallengangsstein postoperativ gefunden wurde. 1969 und 1972 trat eine Cholangitis in 1,4%, 1971 in 0,5% der Fälle auf, 1970 keine einzige. Bei zwei Patienten gab es 1969 eine Narbenhernie nach Oberbauchmedian-schnitt, 1971 bei einem Patienten nach Transrektalschnitt. Der Ikterus sank von 2,1% 1969 auf 0,5% 1972. Die Pankreatitiden hatten mit 2,1% 1971 ihr Maximum. Peritonitis und subphrenischer Abszess traten nur in je einem Fall auf.

Zu II. Allgemeine

Als allgemeine Komplikationen sind insgesamt 14 erwähnenswert. Die Todesfälle werden in einem extra Abschnitt behandelt werden. Die pulmonalen Komplikationen lagen in allen vier Jahrgängen eindeutig an der Spitze, gefolgt in weitem Abstand von den Harnwegsinfekten. Herzinfarkt und Venenthrombose als typische postoperative Allgemeinkomplikationen traten nur in je zwei Fällen auf.

13. Das Postcholecystektomiesyndrom

Bereits 1934 führte FIBRAM die Beschwerden der cholecystektomierten Patienten (insbesondere Oberbauchschmerzen, Völlegefühl, Übelkeit) auf Störungen im Stoffwechsel zurück. Den wichtigsten Platz beim Postcholecystektomiesyndrom nimmt aber sicher der Rezidiv- bzw. der Residualstein ein. Dieser ist ebenso wie postoperative Papillenstenose, zu langer Cysticusstumpf Röhrenstenosen und Pankreopathien bzw. Pankreatitiden operativ korrigierbar (siehe M.CLASSEN und K.SCHWAMMBERGER). Sie sind oft Zeichen einer verspäteten Operation bzw. bestanden diese Befunde zum Teil schon vor dem operativen Eingriff oder sind auf fehlerhaftes Verhalten des Operateurs zurückzuführen.

Der von mir untersuchte Zeitabschnitt ist jedoch zu kurz, um alle Symptome bzw. oben angeführte Befunde erfassen zu können. So traten im untersuchten Krankengut kein zu langer Cysticusstumpf, keine Papillen- und keine Röhrenstenose auf.

Aus Tabelle 16 ist die Häufigkeit der übrigen Symptome des Postcholecystektomiesyndroms zu entnehmen.

Tabelle 16

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
Oberbauchschmerzen	2 1,4	1 0,7	1 0,5	1 0,5
Koliken	2 1,4	1 0,7	0 0	0 0
Choledocholithiasis	2 1,4	0 0	3 1,5	2 1,0
Pankreatitis	0 0	1 0,7	4 2,1	0 0

Die Oberbauchschmerzen liegen hier mit an der Spitze neben der Choledocholithiasis, jedoch erreicht nur die Pankreatitis die 2,0%-Grenze. 1970/71 gab es keinen einzigen Fall mit postoperativen Koliken.

14. Todesfälle

Tabelle 17 zeigt die Anzahl der Todesfälle, sowie deren Unterteilung in komplizierte und unkomplizierte Cholecystektomien.

Tabelle 17

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
unkomplizierte Cholecystektomien	1	0,7	1	0,7	0	0	0	0
komplizierte Cholecystektomien	3	2,1	11	7,8	4	2,1	7	3,2
Zahl der Todesfälle	4	2,8	12	8,5	4	2,1	7	3,2

Die absolute Sterblichkeit lag 1970 mit 8,5% am höchsten, 1971 mit 2,1% am niedrigsten. Bei den komplizierten Cholecystektomien lag die Spitze mit 7,8% ebenfalls im Jahr 1970. Bei unkomplizierten Cholecystektomien lag die Sterblichkeit zwischen 0 und 0,7%. 1971 und 1972 verloren wir keinen Patienten mit einem unkomplizierten Gallensteinleiden. Beide Geschlechter waren in allen Jahrgängen in etwa gleich stark beteiligt.

Das Alter der einzelnen Todesfälle ist aus Tabelle 18 zu entnehmen.

Tabelle 18

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
unter 50 Jahren	0	0	1	0,7	0	0	0	0
50 bis 60 Jahre	0	0	4	2,8	0	0	2	1,0
60 bis 70 Jahre	1	0,7	5	3,5	2	1,0	2	1,0
70 bis 80 Jahre	3	2,1	1	0,7	2	1,0	2	1,0
über 80 Jahre	0	0	1	0,7	0	0	1	0,5

Der jüngste Patient war dabei 45 Jahre, der älteste 82 Jahre. Erwartungsgemäß ist das Alter zwischen 60 und 80 Jahren am stärksten gefährdet.

Tabelle 19 zeigt die Dauer der Anamnese.

Tabelle 19

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
bis 10 Tage	1	0,7	3	2,1	1	0,7	3	1,5
bis 4 Wochen	1	0,7	1	0,7	1	0,7	2	1,0
bis 1/2 Jahr	1	0,7	4	2,8	1	0,7	0	0
bis 1 Jahr	0	0	0	0	0	0	1	0,5
über 1 Jahr	1	0,7	4	2,8	1	0,7	1	0,5

Hier zeigt sich die erstaunliche Tatsache, daß die meisten Patienten eine Anamnese von weniger als sechs Monaten Dauer hatten. Es handelt sich also meist um sehr kurze Anamnesen.

In Tabelle 20 sind der intraoperative Befund der verstorbenen Patienten und die daraus folgenden therapeutischen Maßnahmen aufgeführt.

Tabelle 20

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
1. Cholecystektomie	1	0,7	1	0,7	0	0	0	0
2. Choledocholithiasis	0	0	7	5,0	1	0,5	2	1,0
Choledochusrevision								
Choledochotomie	0	0	8	5,7	1	0,5	3	1,5
3. Papillenstein	0	0	0	0	1	0,5	0	0
Papillenbougie	0	0	0	0	0	0	1	0,5
Papillotomie	0	0	1	0,7	0	0	1	0,5
T-Drain	0	0	9	6,4	1	0,5	3	1,5

Fortsetzung Tabelle 20

	1969	1970	1971	1972
	A %	A %	A %	A %
4. akute Cholecystitis	1 0,7	0 0	0 0	0 0
5. Gallenblasenempyem	0 0	2 1,4	0 0	1 0,5
6. Gallenblasenperforation	0 0	2 1,4	2 1,0	3 1,5
7. Gallenblasenhydrops	1 0,7	0 0	0 0	2 1,0
8. Schrumpfgallenblase	0 0	3 2,1	0 0	0 0
9. Gallenblasennekrose	0 0	2 1,4	1 0,5	1 0,5
10. Gallengangscarcinom	0 0	0 0	0 0	1 0,5
11. Pankreatitis	0 0	0 0	0 0	1 0,5
12. Pankreascarcinom	1 0,7	0 0	1 0,5	1 0,5
13. Peritonitis	0 0	0 0	0 0	1 0,5
14. Leberzirrhose	0 0	2 1,4	1 0,5	0 0
15. Lebermetastasen	1 0,7	0 0	0 0	1 0,5
16. Leberabszess	1 0,7	1 0,7	0 0	0 0
17. Hepatitis	0 0	1 0,7	0 0	0 0
18. Ikterus	1 0,7	1 0,7	0 0	0 0
19. Ulcus duodeni et ventriculi	0 0	2 1,4	0 0	0 0
20. Choledochoduodeno- stomie bei Pankreaskopfcarcinom	0 0	0 0	1 0,5	1 0,5
21. Cholecysto- gastrostomie bei Pankreaskopfcarcinom	2 1,4	0 0	0 0	0 0
22. Duodenotomie	0 0	1 0,7	0 0	0 0
23. Enterotomie	0 0	0 0	1 0,5	0 0
24. Relaparatomie	0 0	1 0,7	0 0	0 0

Was bereits aus Tabelle 17 zu entnehmen war, wird in Tabelle 20 bestätigt: wir verloren die meisten Patienten durch komplizierte Cholecystektomien, insbesondere mit einer Choledocholithiasis und der daraus folgenden Choledochusrevision bzw. Choledochotomie.

Die Todesursachen werden in Tabelle 21 noch einmal einzeln herausgestellt.

Tabelle 21

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
Herzinfarkt	0	0	0	0	0	0	1	0,5
Rechts-Herz-Versagen	0	0	1	0,7	0	0	0	0
AV-Block	0	0	0	0	0	0	1	0,5
Cor pulmonale	0	0	0	0	0	0	1	0,5
Lungenoedem	0	0	1	0,7	0	0	1	0,5
Lungenembolie	0	0	0	0	1	0,5	0	0
Pneumonie	0	0	0	0	0	0	1	0,5
Lebercoma								
Lebermetastasen	2	1,4	3	2,1	0	0	2	1,0
Pankreasoplexie	0	0	0	0	0	0	1	0,5
Aortenstenose,-sklerose	0	0	0	0	1	0,5	0	0
allgemeiner Marasmus	0	0	1	0,7	0	0	0	0

Die häufigste Todesursache war das Coma bei Lebermetastasen, während alle anderen nur jeweils einmal auftraten.

15. Nebentbefunde

Die beim untersuchten Krankengut aufgetretenen Nebentbefunde sind in Tabelle 22 zusammengefaßt.

Tabelle 22

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
Hypertonie	10	7,2	4	2,8	15	8,0	20	10,0
Diabetes	10	7,2	7	5,0	16	8,5	17	7,8
Adipositas	33	23,8	49	34,8	66	35,0	70	32,2
Leberschaden	1	0,7	3	2,1	4	2,1	1	0,5
Ulcus ventriculi	1	0,7	0	0	0	0	1	0,5
Ulcus duodeni	2	1,4	1	0,7	1	0,5	2	1,0
Zustand nach B I oder B II	1	0,7	2	1,4	4	2,1	6	2,8
Herzkrankheit	13	9,4	3	2,1	1	0,5	2	1,0
EKG-Befund	7	5,0	12	8,5	9	4,8	24	11,0
Asthma bronchiale	1	0,7	2	1,4	0	0	0	0
Asthma cardiale	1	0,7	0	0	0	0	0	0
Hiatushernie	0	0	1	0,7	2	1,0	1	0,5
Nierenleiden	0	0	1	0,7	2	1,0	0	0
Carcinom anderer Organe	1	0,7	0	0	3	1,5	6	2,8
Allergie	1	0,7	2	1,4	1	0,5	2	1,0
Appendicitis acuta	1	0,7	0	0	1	0,5	0	0

Erwartungsgemäß liegt hier die Adipositas als häufigster Nebenfund weit an der Spitze, gefolgt von Diabetes und Hypertonie. Erstaunlich niedrig liegt der Leberschaden, der kaum über 2,0% hinauskommt.

16. Familienanamnese

Aus Tabelle 23 wird die familiäre Disposition zur Cholelithiasis ersichtlich.

Tabelle 23

	1969		1970		1971		1972	
	A	%	A	%	A	%	A	%
Gallensteine								
1. bei der Mutter	17	12,2	3	2,1	6	3,2	6	2,8
2. beim Vater	2	1,4	0	0	0	0	2	0,9
3. bei Geschwistern	15	10,8	2	1,4	4	2,1	3	1,5
4. bei Großeltern	1	0,7	1	0,7	0	0	0	0

Am häufigsten findet sich also das Gallensteinleiden bei der Mutter.

III. Zusammenfassung

Sowohl bei Internisten als auch bei Chirurgen herrscht Übereinstimmung darin, daß die Operation des Gallensteinleidens möglichst früh und am Anfang des Leidens erfolgen sollte (KEHR). Das wird gerade in jüngster Zeit durch die ersten enttäuschenden Fehlschläge der Steinauflösungsversuche mit der Chendesoxydolsäure untermauert. Es ist auch in der medizinischen Literatur kaum ein Fall bekannt, in welchem die Steinauflösung komplett gelang (Cholesterinstein). Dagegen wurden auch Fälle beschrieben, bei denen nach Steinverkleinerung durch Chendesoxydolsäure die Steine den Cysticus passierten und zum Ikterus bzw. auch zu einer Pankreatitis (durch Verlegung des Ductus Wirsungianus) führten. Bleiben die Steine in der Gallenblase, so war nach Absetzen der Chendesoxydolsäure röntgenologisch wieder ein erhebliches Wachstum nachweisbar; Gallengangssteine wurden in keinem Fall aufgelöst.

Da also weiterhin zu erwarten ist, daß der nicht operativ entfernte Gallenstein in hohem Maße zu Komplikationen führt, ist eine rechtzeitige Cholecystektomie bei der röntgenologisch nachgewiesenen Cholelithiasis sicher angezeigt.

Wir haben bei der entsprechenden Symptomatik, nach dem ersten röntgenologischen Nachweis einer Cholelithiasis, möglichst bald operiert, ebenso wie nach einer zweimal-negativen Cholecystographie. Bei der akuten Cholecystitis verhielten wir uns zunächst konservativ - falls in den ersten 48 Stunden keine Verstärkung der Symptomatik auftrat - um dann nach entsprechender Vorbereitung und nach Abklingen des akuten Stadiums operativ vorzugehen. Damit stimmen wir in unserem Verhalten u.a. mit CAMP, OCHSNER, EDLUND, OLSSON u.a. überein. Wegen der in den Jahren nach 1972 zu beobachtenden, gefährlich lokalen Komplikationen sind wir jetzt dazu übergegangen, bei älteren Patienten mit akuter Cholecystitis, die Sofortoperation durchzuführen.

Tabelle 24: Letalität bei Cholecystektomien im Schrifttum

Autor	Letalität bei unkomplizierten Cholecystektomien	Letalität bei komplizierten Cholecystektomien	Gesamt- Letalität
Spohn (1973)			3,8%
bei Peritonitis		31,4%	
bei Empyem		8,4%	
bei freier Perforation		24,3%	
bei Cholecystopankreatitis		14,0%	
Ratke (1969)			4,0%-8,0%
bei Verschlussikterus		7,0%	
bei Choledochotomie		20,0%	
bei Perforation		20,0%	
Bergerhof (1967)	2,8%	12,0%	14,8%
Schumann (1962)			15,2%
bei Choledochotomie		24,8%	
Karitzky (1960)	0,9%	36,5%	3,6%
bei Cholecystostomie			
Garreé, Stich, Bauer (1958)	0,5%	6,0%	6,5%
eigenes Krankengut	0,7%	3,8%	4,5%

In Tabelle 24 sind die Ergebnisse verschiedener Autoren der letzten Jahre zusammengefaßt.

Bergerhof gibt in seinem Buch "Die Letalität in der Gallensteinchirurgie" 2,8% bei den unkomplizierten Cholecystektomien an, was, verglichen mit den Zahlen bei Karitzky (0,9%), bei Garré, Stich, Bauer (0,5%) und unserem eigenen Krankengut (0,7%), relativ hoch erscheint. Ebenso seine Angabe zur Gesamtletalität mit 14,8%, die nur wenig unter der von Schumann mit 15,2% liegt. Dem gegenüber steht eine Gesamtletalität von 3,6% bei Karitzky, 3,8% bei Spohn, 4-8% bei Ratke, 6,5% bei Garré, Stich, Bauer und 4,5% beim eigenen Krankengut.

Am stärksten differieren die Prozentzahlen bei den komplizierten Cholecystektomien, da teilweise unterschiedliche Diagnosen und die daraus folgenden Operationen angegeben sind.

Spohn, der in Peritonitis, Empyem, freie Perforation und Cholecysto-pankreatitis unterteilt, liegt mit 31,4% Letalität bei Peritonitis noch um 7,1% niedriger als Karitzky, der mit 38,5% die Tabelle anführt.

Bei Choledochotomie liegt Schumann um 4,8% höher als Ratke mit 20%. Spohn, dessen Letalität beim Empyem 8,4% erreicht, liegt mit 24,3% bei der Perforation um mehr als 4% höher als Ratke mit wiederum 20%. Bei ihm erscheint unter den komplizierten Cholecystektomien außerdem noch der Verschlußikterus mit 7%.

Betrachtet man die Letalität bei komplizierten Cholecystektomien unseres eigenen Krankengutes, so liegen wir mit 3,8% sehr gut. Aufgrund der vorliegenden Vergleichszahlen, läßt sich also für uns eindeutig der Schluß ableiten, daß man beim Gallensteinleiden möglichst sofort nach Diagnosestellung im unkomplizierten Stadium operieren muß.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

1. BERGERHOF, H.D.

Untersuchungen zur
Frühoperation des
Gallensteinleidens.
Dtsch.med.Wschr. 91 (1966)
1590-1593
2. BERGERHOF, H.D.

Die Letalität in der
Gallensteinchirurgie.
Dtsch.med.Wschr. (1967)
157-161
3. BÖHMIG, H.J.

Reoperationen nach
transduodenaler
Sphinkterotomie.
Chir.Praxis 1971, Heft 15
4. CLASSEN, M. und
SCHWAMBERGER, K.

Reintervention an
den Gallenwegen.
Der Chirurg, April 1974
5. DE CAMP, OCHSNER, BAFFES u.a.

Annals of Surgery, 135
(1952), 734-750
Timing in the Treatment
of acute Cholecystitis.
6. EDLUND, Y.,
OLSSON, O.

Acute Cholecystitis,
it's Aetiology and Course,
with special Reference
to the Timing of
Cholecystektomie.
Acta Chir.Scand. 120 (1961)
470-494
7. FEHR, A.M.

Gallensteinprobleme.
Schweiz.med.Wschr. 98
(1968) 98-101
8. FRISCH, A.

Die Eingriffe an den
tiefen Gallenwegen.
Langenbecks Archiv
klin.Chir. 302 (1963)
524-540
9. GATCH, W.D. u.a.

The Nature and Treat-
ment of Cholecystitis.
The Journal of the
American Med. Association
132/3, (1946) 119
10. GLENN, F.

Surgical Treatment of
Acute Cholecystitis in
the Elderly Geriatrics.
September 1965, 728-738
11. GLENN, F.

Acute Cholecystitis.
Surgery, Gynecology and
Ostetrics 69 (1939)
431-435

12. HAMELMANN, H. Rezidive nach Gallensteinoperationen.
Chirurg 32 (1961) 28-32
13. HEIM, W. Zur Problematik der postoperativen Beschwerden nach Gallenblasenentfernung.
Zentralblatt f.Chirurgie 75 (1950) 1225-1240
14. HEUER, G.J. The Surgical Aspects of Acute Cholecystitis.
Annals of Surgery 105 (1937), 758-764
15. HÖSSLER, J. Gallenchirurgie im mittleren Krankenhaus.
Zentralblatt f.Chirurgie (1962), 1305-1311
16. KOELSCH, K.A. Das Postcholecystektomie-syndrom.
Chir.Praxis 1971 Heft 15
17. JIMENEZ, CH.P. Die Behandlung der Gallenblasenperforation und des Gallensteinileus.
Mchn.med.Wschr. 108 (1966), 1323-1329
18. KARITZKY, B. Gallenchirurgie im kleinen Krankenhaus.
Zentralblatt f.Chirurgie (1960), 2111-2124
19. MICHELSEN, E.,
BRAUNER, G. Technik und Ergebnisse bei 1316 Gallenwegsoperationen.
Brun's Beiträge klin. Chirurgie 217, (1969) 604-612
20. MOGENA, H.G. Das Postcholecystektomie-syndrom.
Mnch.med.Wschr. 108 (1966), 1320-1323
21. LINDAHL, F.,
CEDERQUIST, C.L. The Treatment of Acute Cholecystitis.
Acta Chir.Scand.Suppl.396 (1969), 9-15
22. PEARCE, A.E.
(Philadelphia) Acute Cholecystitis.
The Pennsylvania Med. Journal June 1955 598-602
23. PINES, B.,
RABINOVICH, J. Perforation of the Gallbladder in Acute Cholecystitis.
Annals of Surgery 140 (1954), 170-179

24. REIFFERSCHIED, M. Aktuelle Chirurgie 1972
Band 7, Heft 13
25. SCHUMANN, U. Bericht über 278 Chole-
dochotomien bei Gallen-
steinleiden von
1953-1959.
Zentralblatt f.Chirurgie
(1962), 823-831
26. SIEDE, W., ZUCKSCHWERT, DUPREZ Akute und chronische
Gallenblasenentzündung.
Chir.Praxis 1971, Heft 15
27. SPOHN, K. Langenbeck's Archiv
f.Chirurgische Klinik
1973 (kongressband)

Herrn Prof. Dr. F. Gall

danke ich für die Überlassung des Themas. Für die verständnisvolle Förderung und die wertvollen Hinweise bei der Ausführung der Arbeit gilt ihm wie auch Herrn Dr. med. H. Hoseus mein aufrichtiger Dank.

Lebenslauf

Am 21. Juli 1945 wurde ich als fünfter Sohn des Textilkaufmanns Walter Stumpf und dessen Ehefrau Margarete Stumpf in Cham/Opf. geboren. Kurz danach siedelte die Familie nach Fürth/Bay. über, wo ich vom 1. September 1952 bis Juli 1956 die Volksschule besuchte.

Vom September 1956 bis Juli 1965 war ich an der dortigen Oberrealschule, wo ich 1965 die Reifeprüfung ablegte.

Nach einem Semester Tiermedizin an der Universität München nahm ich im Sommersemester 1966 das Studium der Humanmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg auf. Dort beendete ich mein Studium im Februar 1972 mit Ablegung der Ärztlichen Prüfung.

1970 heiratete ich. Die Ehe, aus der zwei Kinder hervorgingen, wurde 1974 geschieden.

Seit 2. August 1974 bin ich mit meiner Frau Ulrike, geb. Krauß, verheiratet.

Am 1. Oktober 1975 ließ ich mich als praktischer Arzt mit H-Verfahren nieder.

Buchdruck - Offsetdruck

Karl Döres, 852 Erlangen, Jägerstr. 3 · Tel. 2 15 21